

Recensement des oiseaux de Noël 2008

Le Recensement des oiseaux de Noël a vu le jour il y a plus de cent ans lorsque 27 adeptes de la conservation provenant de 25 localités différentes changèrent le cours de l'histoire. Le 25 décembre 1900, ce petit groupe, sous la direction de M. Frank Chapman, instaura une nouvelle activité en réponse à l'activité habituelle qui se déroulait à cette période de l'année et qui consistait à déterminer quelle équipe réussirait à abattre le plus grand nombre d'oiseaux et de petits animaux en une journée. Au lieu de chasser les oiseaux, M. Chapman proposa de les compter et constitua, par le fait même, la base d'un des plus importants projets de conservation faisant appel à des bénévoles au monde.

Avec plus d'un siècle d'existence, le RON s'avère le plus ancien inventaire faunique faisant appel à des bénévoles au monde. Le RON permet aux chercheurs d'avoir accès à une des plus importantes bases de données, laquelle est utilisée en vue de suivre l'état des populations d'oiseaux résidents et migrateurs à travers l'hémisphère occidental. Les données amassées depuis 1900 ont été compilées par la Société Audubon et sont disponibles sur leur site Internet www.audubon.org. Depuis 2000, Études d'Oiseaux Canada est le responsable du volet canadien de cet immense projet; les résultats canadiens sont disponibles sur le site internet www.bsc-eoc.org.

Cette activité consiste à identifier le plus grand nombre possible d'oiseaux (un maximum d'espèces mais aussi un maximum d'individus) à l'intérieur d'un cercle de 24 km de diamètre durant une seule journée d'activité. Cette journée est choisie à l'intérieur de la période officielle déterminée par la Société Audubon. Cette période, qui est la même pour tous les pays participants, est du 14 décembre au 5 janvier. Les espèces manquées le jour du recensement mais observées au cours des trois jours qui le précèdent ainsi que les trois jours qui le suivent peuvent être mentionnées dans le rapport des espèces observées durant la semaine du recensement.

À chaque année, plus de 55 000 bénévoles de toutes les provinces et de tous les territoires canadiens, des 50 États américains, de certains pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, des Bermudes, des Antilles et des îles du Pacifique prennent part au RON. Ici au Canada, environ 19 000 personnes, réparties dans un total de plus de 350 zones de recensement, participent au RON.

Notre RON 2008 a eu lieu le 14 décembre. Les vieux routiers le connaissent et l'attendent, mais pour plusieurs, c'est encore une activité peu ou pas connue. Le recensement 2008 a permis de confirmer la présence de 66 espèces en Gaspésie. Les différentes équipes de courageux observateurs ont dénombré un total de 7433 oiseaux. Cette année, les grands rassemblements d'oiseaux n'étaient pas de la partie comme en témoigne notre total d'individus observés.

60 observateurs, en auto, à pied, à ski, en raquettes, seul ou en équipe, sur le terrain et aux mangeoires, ont volontairement accepté de se lever tôt et d'affronter le froid, pour repérer la faune ailée. Ces personnes participaient au 108^e recensement des oiseaux de Noël (RON) organisé par la Société Audubon en Amérique du Nord.

L'activité sera donc de retour cette année, plus il y a de paires d'yeux, plus tôt ce sera le matin et tard en fin de journée, plus les observations seront nombreuses et les territoires mieux couverts! Le plus difficile est peut-être de se lever ce matin-là! Après, nous manquons de temps...

Chantal Dufort

NOM DE L'ESPÈCE	Secteur	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total
Plongeon huard (Common Loon)		4	2			6
Grèbe jougris (Red-necked Grebe)			1			1
Cormoran à aigrettes (Double-Crested Cormorant)		2		1		3
Grand Cormoran (Great Cormorant)		128	44	1		173
Bernache du Canada (Canada Goose)		1100	11			1111
Canard noir (American Black Duck)		466	38	24		528
Canard colvert (Mallard)		20				20
Eider à duvet (Common Eider)		47	523			570
Arlequin plongeur (Harlequin Duck)		6				6
Macreuse noire (Black Scoter)		7	1			8
Macreuse à front blanc (Surf Scoter)		2				2
Harelde kakawi (Oldsquaw)		140	575			715
Garrot à oeil d'or (Common Goldeneye)		58	152	6		216
Garrot d'Islande (Barrow's Goldeneye)		22	104	1		127
Grand Harle (Common Merganser)		13		2		15
Harle huppé (Red-Breasted Merganser)		75	47	14		136
Pygargue à tête blanche (Bald Eagle)					1	1
Autour des palombes (Northern Goshawk)		1			2	3
Gélinotte huppée (Ruffed Grouse)		6			4	10
Bécasseau violet (Purple Sandpiper)		1	3			4
Goéland sp. (Gull sp.)		3				3
Goéland à bec cerclé (Ring-billed Gull)		2				2
Goéland argenté (Herring Gull)		153	59	15		227
Goéland arctique (Iceland Gull)		27	21	1		49
Goéland bourgmestre (Glaucous Gull)		43	5			48
Goéland marin (Gr.Bl.-backed Gull)		139	65	6		210
Mouette tridactyle (Black-legged kittiwake)		3	5			8
Mergule nain (Dovekie)		2	1			3
Guillemot à miroir (Black Guillemot)		143	47	2		192
Pigeon biset (Rock Dove)			39	3	60	102
Tourterelle triste (Morning Dove)		13	33	6	33	85
Harfang des neiges (Snowy Owl)		1	2			3
Pic sp. (Woodpecker sp.)			1			1
Pic mineur (Downy Woodpecker)		5	3		9	17
Pic chevelu (Hairy Woodpecker)		2	6		13	21
Pic flamboyant (Northern Flicker)		2	1			3
Grand Pic (Pileated Woodpecker)		3				3
Pie-grièche grise (Northern Shrike)		3	3			6
Mésangeai du Canada (Gray Jay)		3	8		5	16
Geai bleu (Blue Jay)		34	37	3	108	182
Corneille d'Amérique (American Crow)		63	100	29	101	293
Grand Corbeau (Common Raven)		20	48	2	18	88
Mésange à tête noire (Black-capped Chickadee)		185	180	8	197	570
Mésange à tête brune (Boreal Chickadee)		10	12		2	24
Sittelle à poitrine rousse (R.-br. Nuthatch)		4	15	2	6	27
Sittelle à poitrine blanche (W.-br. Nuthatch)					2	2
Roitelet à couronne dorée (Golden crowned Kinglet)		3	3			6
Merle d'Amérique (American Robin)		1	9		9	19
NOM DE L'ESPÈCE	Secteur	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total

NOM DE L'ESPÈCE	Secteur	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total
Jaseur boréal (Bohemian Waxwing)		1	338		73	412
Jaseur d'Amérique (Cedar Waxwing)			1			1
Étourneau sansonnet (European Starling)		14	165	2	57	238
Bruant hudsonien (American Tree Sparrow)			6			6
Bruant chanteur (Song Sparrow)		3	1		1	5
Junco ardoisé (Dark-eyed Junco)		*				*
Bruant des neiges (Snow Bunting)		24	159		64	247
Cardinal rouge (Northern Cardinal)					1	1
Carouge à épaulettes (Red-Winged Blackbird)			1			1
Quiscale bronzé (Common Grackle)		1				1
Durbec des sapins (Pine Grosbeak)		33	27	18	88	166
Roselin pourpré (Purple Finch)			6			6
Bec-croisé des sapins (Red Crossbill)			5			5
Bec-croisé bifascié (White-Winged Crossbill)				6	2	8
Sizerin flammé (Common Redpoll)		34	7		20	61
Tarin des pins (Pine Siskin)		2	2	6		10
Chardonneret jaune (American Goldfinch)				12	34	46
Gros-bec errant (Evening Grosbeak)		20	44	15	103	182
Moineau domestique (House Sparrow)			13	15	11	39
Vacher à tête brune (Brown-Headed Cowbird)					2	2

Total des espèces (jour du recensement)	51	49	25	28	65
Total des espèces (semaine du recensement)	52	49	25	28	66
Total d'individus	3 097	2 979	200	1 026	7 433
NOMBRE D'OBSERVATEURS	24	22	4	10	60

* signifie que l'espèce a été observée trois jours avant ou trois jours après le jour du recensement