

| NOM DE L'ESPÈCE | 2015 | Secteur | Forillon | Percé | New Richmond | Matapédia | Total |
|--|------|---------|----------|-------|--------------|-----------|-------|
| Bernache du Canada (Canada Goose) | | | 400 | | | | 400 |
| Canard noir (American Black Duck) | | | 200 | 16 | 18 | | 234 |
| Canard colvert (Mallard) | | | | | 26 | 3 | 29 |
| Eider à duvet (Common Eider) | | | 229 | 267 | | | 496 |
| Arlequin plongeur (Harlequin Duck) | | | 31 | | | | 31 |
| Macreuse à front blanc (Surf Scoter) | | | 3 | 4 | | | 7 |
| Macreuse à bec jaune (Black Scoter) | | | 50 | 36 | | | 86 |
| Macreuse brune (White-fringed Scoter) | | | | 2 | | | 2 |
| Harelde kakawi (Long-tailed Duck) | | | | 185 | | | 185 |
| Garrot à oeil d'or (Common Goldeneye) | | | 65 | 58 | | | 123 |
| Garrot d'Islande (Barrow's Goldeneye) | | | 42 | 188 | | | 230 |
| Petit Garrot (Bufflehead) | | | 1 | 4 | | | 5 |
| Grand Harle (Common Merganser) | | | 101 | | | | 101 |
| Harle huppé (Red-breasted Merganser) | | | | 246 | | | 246 |
| Gélinotte huppée (Ruffed Grouse) | | | 5 | | | 11 | 16 |
| Plongeon huard (Common Loon) | | | | 2 | | | 2 |
| Grèbe jougris (Red-necked Grebe) | | | | 1 | | | 1 |
| Fou de Bassan (Northern Gannet) | | | | 1 | | | 1 |
| Cormoran à aigrettes (Double-crested Cormorant) | | | 3 | | | | 3 |
| Grand Cormoran (Great Cormorant) | | | 13 | 21 | | | 34 |
| Cormoran sp. (Cormorant sp.) | | | 1 | | | | 1 |
| Grand Héron (Great Blue Heron) | | | | 4 | | | 4 |
| Pygargue à tête blanche (Bald Eagle) | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Épervier brun (Sharp-shinned Hawk) (Northern) | | | 1 | | 1 | | 2 |
| Autour des palombes (Northern Goshawk) | | | | 1 | | | 1 |
| Buse pattue (Rough-legged Hawk) | | | | 1 | | | 1 |
| Faucon émerillon (Merlin) | | | | 1 | | | 1 |
| Faucon gerfaut (Gyr Falcon) | | | | cw | | | cw |
| Faucon pèlerin (Peregrine Falcon) | | | | 1 | | | 1 |
| Faucon sp. (Falcon sp.) | | | 1 | | | | 1 |
| Bécasseau violet (Purple Sandpiper) | | | | 3 | | | 3 |
| Bécassine de Wilson (Wilson's Snipe) | | | | 1 | | | 1 |
| Mouette rieuse (Black-headed Gull) | | | | 2 | | | 2 |
| Goéland à bec cerclé (Ring-billed Gull) | | | | 2 | 15 | | 17 |
| Goéland argenté (Herring Gull) | | | 161 | 31 | 31 | | 223 |
| Goéland arctique (Iceland Gull) | | | 17 | 78 | 3 | | 98 |
| Goéland bourgmestre (Glaucous Gull) | | | 22 | 7 | 1 | | 30 |
| Goéland marin (Great Black-backed Gull) | | | 86 | 69 | 48 | | 203 |
| Goéland sp. (Gull sp.) | | | | 5 | | | 5 |
| Mouette tridactyle (Black-legged Kittiwake) | | | | 67 | | | 67 |
| Petit Pingouin (Razorbill) | | | 1 | 2 | | | 3 |
| Guillemot à miroir (Black Guillemot) | | | 6 | 37 | | | 43 |
| Pigeon biset (Rock Dove) | | | 15 | 61 | 71 | 91 | 238 |
| Tourterelle triste (Mourning Dove) | | | 47 | 78 | | 32 | 157 |
| Grand-duc d'Amérique (Great Horned Owl) | | | | cw | | | cw |
| Harfang des neiges (Snowy Owl) | | | | 1 | | | 1 |
| Pic mineur (Downy Woodpecker) | | | 1 | 2 | | 6 | 9 |
| Pic chevelu (Hairy Woodpecker) | | | | 2 | | 12 | 14 |
| Grand pic (Pileated Woodpecker) | | | | | | 1 | 1 |
| Pic sp. (Woodpecker sp.) | | | 2 | | | | 2 |
| Pie-grièche grise (Northern Shrike) | | | | 1 | | 1 | 2 |
| Mésangeai du Canada (Gray Jay) | | | | 3 | | 28 | 31 |
| Geai bleu (Blue Jay) | | | 23 | 43 | | 179 | 245 |
| Cornille d'Amérique (American Crow) | | | 41 | 81 | 38 | 24 | 184 |
| Grand Corbeau (Common Raven) | | | 14 | 50 | 15 | 16 | 95 |
| Mésange à tête noire (Black-capped Chickadee) | | | 50 | 71 | 3 | 337 | 461 |
| Mésange à tête brune (Boreal Chickadee) | | | 6 | 9 | | 10 | 25 |
| Sittelle à poitrine rousse (Red-breasted Nuthatch) | | | 3 | 1 | | 50 | 54 |
| Troglodyte de Caroline (Carolina Wren) | | | | | | 1 | 1 |
| Roitelet à couronne dorée (Golden crowned Kinglet) | | | 1 | | | | 1 |
| Grive solitaire (Hermit Thrush) | | | | 1 | | | 1 |
| Moqueur chat (gray Catbird) | | | | cw | | | cw |
| Étourneau sansonnet (European Starling) | | | 22 | 92 | 34 | 94 | 242 |
| Jaseur boréal (Bohemian Waxwing) | | | | 9 | 4 | 85 | 98 |
| Bruant hudsonien (American Tree Sparrow) | | | | 12 | | | 12 |
| Bruant à gorge blanche (White-throated Sparrow) | | | 1 | | | | 1 |
| Junco ardoisé (Dark-eyed Junco) | | | | | | 2 | 2 |
| Plectrophane des neiges (Snow Bunting) | | | | 21 | 40 | 1617 | 1678 |
| Quiscale bronzé (Common Grackle) | | | | 1 | | 2 | 3 |
| Durbec des sapins (Pine Grosbeak) | | | 3 | 11 | | 22 | 36 |
| Roselin pourpré (Purple Finch) | | | 1 | | | | 1 |
| Bec-croisé bifascié (White-winged Crossbill) | | | 1 | | | | 1 |
| Sizerin flammé (Common Redpoll) | | | 3 | 7 | | 80 | 90 |
| Chardonneret jaune (American Goldfinch) | | | | 14 | | 215 | 229 |
| Gros-bec errant (Evening Grosbeak) | | | | 26 | | 61 | 87 |
| Moineau domestique (House Sparrow) | | | | 14 | 30 | 143 | 187 |
| | | | | | | | |
| Total des espèces (jour du recensement) | | | 40 | 56 | 17 | 27 | 76 |
| Total des espèces (semaine du recensement) | | | | 3 | | | 3 |
| Total d'individus sp. (jour du recensement) | | | 4 | 5 | | | 9 |
| Total d'individus | | | 1 674 | 1 956 | 380 | 3 126 | 7 136 |
| | | | | | | | |
| NOM DE L'ESPÈCE | 2015 | Secteur | Forillon | Percé | New Richmond | Matapédia | Total |
| NOMBRE D'OBSERVATEURS SUR LE TERRAIN | | | 11 | 15 | 3 | 13 | 42 |
| Nombre d'observateurs aux mangeoires | | | | 6 | | 3 | 9 |

cw (count week) signifie que l'espèce a été observée dans la semaine du recensement (3 jours avant ou 3 jours après).

Christianne Pitre

Recensement des oiseaux de Noël (RON) 2015

Cette année, le RON s'est déroulé le 16, le 19 et le 20 décembre 2015, selon la possibilité de chaque secteur. Une vélocité variant de 0 à 50 km/h. et un couvert de neige de 1 à 35 cm favorisait la marche en raquettes par endroits. Les cours d'eau étaient partiellement gelés et le mercure oscillait entre 0° et -10°C . 42 participants ont parcouru au total 893 km. et 113 heures d'observations sur le terrain. 9 personnes ont rapporté les individus ailés fréquentant leurs mangeoires, ils y ont consacré 36 heures en tout. Cette belle activité a permis de répertorier 76 espèces d'oiseaux, pour un total de 7,136 individus lors du RON.

Pour Forillon :

Un nombre de **40 espèces** avec un total de **1,674 oiseaux** est dénombré le jour de ce recensement. L'**Épervier brun** (1) est observé pour une première fois lors d'un RON sur ce territoire. Le **Grand Harle** (101) s'est présenté en un plus grand nombre, en cette période de l'année. Par contre, le **Sizerin flammé** (3) fut répertorié en nombre moindre en ce temps de recensement annuel.

Pour Percé :

Le total est de **56 espèces** pour un nombre de **1,956 individus**. Les espèces les plus remarquables sont : le **Grand Héron** (4) dont le nombre est le plus grand à ce jour. La **Bécassine de Wilson** (1), notée pour une deuxième fois seulement. La **Mouette rieuse** (2), notée pour une première fois. La **Buse pattue** (1), notée pour une quatrième fois. Le **Faucon émerillon** (1), noté pour une quatrième fois. La **Grive solitaire** (1), notée pour une première fois. Plusieurs espèces ont brillé par leur absence comme la **Bernache du Canada**, le **Canard colvert**, le **Roitelet à couronne dorée**, le **Merle d'Amérique**, le **Junco ardoisé**, le **Roselin pourpré** et le **Tarin des pins**. D'autres brillent par leur petit nombre comme le **Mésangeai du Canada** (3), la **Mésange à tête noire** (71) et **Mésange à tête brune** (9), la **Sittelle à poitrine rousse** (1) et le **Sizerin flammé** (7). Trois espèces ont été vues pendant la semaine du décompte seulement soit : le **Grand-duc d'Amérique**, le **Faucon gerfaut** et le **Moqueur chat**; ce dernier est noté pour une première fois dans la semaine du décompte sur ce territoire.

Pour New-Richmond :

Peu d'espèces observées malgré ce redoux; un total de seulement **17 espèces** ont été répertoriées pour **380 individus**. Le vent assez fort n'a pas permis d'avoir du succès, côté marin. Parmi les espèces observées, il faut souligner la présence de (2) **Pygargues à tête blanche** adultes et surtout de (1) **Épervier brun**. Aucune **Bernache du Canada** n'était présente cette année ce qui est plutôt exceptionnel pour cette parcelle par rapport aux années antérieures.

Pour Matapédia :

27 espèces d'oiseaux ont été observées pour un total de **3,126 individus** comptés lors de ce RON. Le **Troglodyte de Caroline** fut observé pour une première fois, lors d'un RON, dans Avignon-Ouest; il fréquente les mangeoires chez Gilberte Arsenault, depuis l'automne. Les espèces observées en plus grand nombre d'individus, sur ce territoire, sont la **Gélinotte huppée** (11) dépassant de 3 individus le record, le **Plectrophane des neiges** (1,617) pour sa part dépasse de 542 individus le record et le **Chardonneret jaune** (215) record dépassé de 12 individus, dans Avignon-O. Aucune **Sittelle à poitrine blanche** depuis une 3^{ième} année consécutive dans ce secteur.

Merci à tous les participants de rendre cette activité des plus agréables à recenser les oiseaux dans notre belle Gaspésie.

Christianne Pitre